

MODALITES DE CONSERVATION DES SPECIALITES ORALES LIQUIDES ET/OU RECONSTITUEES APRES OUVERTURE.

Les délais de conservation après ouverture mentionnés dans le tableau impliquent que:

- le prélèvement des flacons respecte les règles élémentaires d'hygiène afin d'éviter toute contamination microbienne.
- les flacons soient systématiquement rebouchés après usage et stockés dans des conditions normales.

La mention « pas d'informations disponibles » signifie qu'aucune étude de stabilité après ouverture de la spécialité n'a été effectuée par le laboratoire pharmaceutique. Dans ce cas il est recommandé de conserver la spécialité seulement pendant la durée usuelle d'un traitement non interrompu aux posologies habituelles.

SOURCES DOCUMENTAIRES

Informations figurant sur conditionnements et/ou sur notices des spécialités.

Informations Laboratoires pharmaceutiques.

Classement par ordre alphabétique de DCI :



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sélectionnez la première lettre de la DCI dans la liste ci-dessus.


Mise à jour : 20/10/2003

 Retour au sommaire


D.C.I.	Nom commercial	Présentations	Modalités de conservation
A			
Acébutolol	Sectral	Solution pédiatrique 125ml	180 jours.
Aciclovir	Zovirax	Suspension buvable 125 ml	30 jours.
Alimémazine	Théralène	Solution buvable 30 ml -100 ml	120 jours.
Almitrine + Raubasine	Duxil	Gouttes 48 ml	60 jours.
Alpha-Amilase	Mégamylase	Sirop 125 ml	10 jours.

Alumine	Lithiagel	Suspension 480 ml	30 jours.
Ambroxol	Muxol	Suspension buvable 180 ml	Pas d'informations disponibles.
Amisulpride	Solian	Solution buvable 60 ml	60 jours
Amitriptyline	Laroxyl	Gouttes 4% 20 ml	90 jours.
Amoxicilline + Acide clavulanique	Augmentin	Poudre pour suspension buvable à 100 mg/ml nourrisson	Après reconstitution de la suspension, 7 jours au réfrigérateur.
Amphotéricine B	Fungizone	Suspension buvable 40 ml	10 jours à T° ambiante avec ouverture quotidienne.
Atovaquone	Wellvone	Suspension buvable 750 mg / ml	21 jours (durée du traitement)
 retour au début			
B			
Bétaméthazone	Célestène	Gouttes buvables 30 ml	60 jours à température ambiante.
 retour au début			
C			
Carbamazépine	Tégrétol	Suspension buvable 150 ml	2 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur et en rebouchant bien le flacon après usage.
Carbocistéine	Rhinathiol	Sirap adulte 125 ml	Pas d'informations disponibles.
		Sirap nourrisson et enfant 125 ml	
Carbocistéine sans sucre	Carbocistéine RPG	Solution buvable sans sucre 300 ml	Pas d'informations disponibles.
Céfaclor	Alfatil	Poudre pour suspension buvable 125 mg-250 mg	Après reconstitution, 14 jours au réfrigérateur.
Céfadroxil	Oracéfal	Poudre pour sirop 125 mg-250 mg-500 mg	Après reconstitution ,7 jours à température ambiante.


Céfatrizine	Céfaperos	Poudre pour sirop 125 mg	Après reconstitution , 10 jours à température ambiante.
Céfpodoxime	Orélox	Granulés pour suspension de 50 ml	Après reconstitution 10 jours au réfrigérateur.
Chlorpromazine	Largaetil	Gouttes buvables 30 ml	90 jours.
Ciclosporine	Néoral	Solution buvable 50 ml	60 jours entre 15 et 30°C. Eviter un stockage prolongé à température inférieure à 20°C
Ciclosporine	Sandimmun	Solution buvable 50 ml	60 jours au dessous de 30°C. Ne jamais mettre le flacon au réfrigérateur.
Cisapride	Prépuksid	Suspension buvable pédiatrique 100ml	1 mois.
Clobutinol	Silomat	Sirop 125 ml	21 jours.
Clonazepam	Rivotril	Gouttes buvables 20 ml	90 jours.
Codéine phosphate	Codenfan	Sirop 200 ml	10 jours
Cyamémazine	Tercian	Solution buvable 4% 30 et 100 ml	15 jours.
 retour au début			
D			
Dexchlorphéniramine	Polaramine	Sirop 125 ml	1 mois à T° ambiante.
Diazépam	Valium	Gouttes 1% 20 ml	90 jours.
Didanosine	Videx	Poudre 4 g	La solution reconstituée avec un antiacide se conserve jusqu'à 30 jours à +2 +8° C.
Digoxine	Digoxine nativelle	Soluté oral pédiatrique 60 ml	60 jours.
Dihydroergocryptine+ Caféine	Vasobral	Soluté buvable 50 ml	Pas d'informations disponibles.
Dihydroergotamine	Séglor	Gouttes 75 ml	Pas d'informations disponibles.
Dompéridone	Motilium	Suspension buvable 200 ml	1 mois.

 retour au début**E**


Ergocalciférol	Zyma D.2	Gouttes 10 ml	Pas d'informations disponibles.
Ergocalciférol	Uvestérol	Gouttes 20 ml	20 jours.
Ethosuximide	Zarontin	Sirop 200 ml	30 jours

 retour au début**F**


Férédate de sodium	Ferrostrane	Sirop 125 ml	Pas d'informations disponibles.
Fluconazole	Triflucan	Pdre pour susp. buvable 50 mg / 5 ml	14 jours à température ambiante
Fluoxétine	Prozac	Solution buvable 70 ml -20 mg	Pas d'informations disponibles.
Fluphénazine	Moditen fort	Gouttes 4% 20 ml	3 à 30 jours.
Furosémide	Lasilix	Solution buvable 10 mg/ml	40 jours.
Fusidique acide	Fucidine	Suspension buvable :Enfant 250 mg/5 ml- 90 ml et Nourrisson 100 mg/5 ml -50 ml	Pas d'informations disponibles.

 retour au début**G**

Gingko biloba extrait	Ginkogink	Solution buvable 30 ml	Pas d'informations disponibles.
------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------


 retour au début**H**

Halopéridol	Haldol	Gouttes 2 mg/ml 15 ml	3 mois dans les conditions normales d'utilisation.
Heptaminol	Hept-a-myl	Gouttes buvables 20ml	Pas d'informations disponibles.
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium	Xolaam	Suspension buvable 250 ml	15 jours.
Hydroxyzine	Atarax	Sirop 200 ml	1 mois à 25°C.


 retour au début**I**

Intrait de marron d'inde	Intrait de marron d'inde	Gouttes 60 ml	Pas d'informations disponibles.
---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------

Itraconazole	Sporanox	Solution buvable 10 mg / ml 150 ml	1 mois
---------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

 retour au début**J**

Josamycine	Josacine	Suspension buvable 125 mg-250 mg	Après reconstitution, 7 jours.
-------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------------

 retour au début**L**


Lactulose	Lactulose RPG	Soluté buvable 66 % 200 ml	1 mois à température ambiante
------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Lamivudine	Epivir	Solution buvable 240 ml	30 jours
-------------------	---------------	-------------------------	----------

Lévocarnitine	Lévocarnil	Solution buvable 10 ml 100 mg/ml	3 jours au réfrigérateur en refermant avec le bouchon plastique.
----------------------	-------------------	----------------------------------	--

Lévomépromazine	Nozinan	Gouttes 4% 30 ml	1 an.
------------------------	----------------	------------------	-------

Lopéramide	Imodium	Soluté buvable 90 ml	1 mois.
-------------------	----------------	----------------------	---------


 retour au début**M**




Méthylergométrine	Méthergin	Gouttes buvables 10 ml	6 jours à T° ambiante et à l'abri de la lumière.
--------------------------	------------------	------------------------	--


Méoclopramide	Primpéran	Gouttes buvables 60ml et soluté buvable 200 ml	90 jours.
----------------------	------------------	--	-----------





Métopimazine	Vogalène	Suspension buvable 0.1% 150 ml	Pas d'informations disponibles.
---------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------------


Métronidazole	Flagyl	Suspension buvable 120 ml	15 jours.
----------------------	---------------	---------------------------	-----------

 retour au début**N**

Nalidixique acide	Negram	Suspension buvable 120 ml	Pas d'informations disponibles.
Névirapine	Viramune	Suspension buvable 50 mg/ml 240 ml	2 mois après ouverture.
Niaprazine	Nopron	Sirop 150 ml	30 jours.
Nifuroxazide	Ercéfuryl	Suspension 90 ml	30 jours.
Nystatine	Mycostatine	Suspension orale 24 ml	Après reconstitution, 7 jours maxi à T° > à 25°C.
 retour au début			
O			
Oxacilline	Bristopen	poudre pour sirop à 250 mg /5 ml	Après reconstitution, 15 jours au réfrigérateur.
 retour au début			
P			
Paracétamol	Efféralgan pédiatrique	Soluté buvable 90 ml	1 an à température ambiante.
Périciazine	Neuleptil	Gouttes 4% 30 ml	180 jours.
Phénoxy-méthyl-pénicilline	Oracilline	Sirop 120 ml	15 jours à une température < 20°C. Ne pas conserver au réfrigérateur .
Phosphore	Phosphoneuros	Soluté buvable 120 ml	1 mois après ouverture.
Phytoménadione	Vitamine K1	Gouttes 10 ml	90 jours.
Pipampérone	Dipipéron	Gouttes 30 ml	1 mois.
Pipothiazine	Piportil	Gouttes 10 ml	40 jours.
Potassium	Potassium gluconate	Sirop 250 ml	Pas d'informations disponibles.
Prazébam	Lysanxia	Gouttes 20 ml	Pas d'informations disponibles.
Prédnisolone	Solupred	Solution buvable 50 ml	2 ans à température ambiante
 retour au début			
R			

Raubasine + dihydroergocristine	Iskédyl	Gouttes 30ml	Pas d'informations disponibles.
Rifampicine	Rifadine	Suspension buvable 120 ml	Pas d'informations disponibles.
Ritonavir	Norvir	Solution buvable 90 ml	Le sirop de NORVIR doit être conservé à température ambiante (20-25°). Il doit être utilisé dans un délai de trente jours après l'ouverture du flacon. Il est conseillé d'inscrire la date d'ouverture sur l'étiquette du flacon . Par mesure de précaution, il ne doit pas être entreposé au réfrigérateur ni être exposé à une température excessive (plage arrière de la voiture par exemple).
 retour au début			
S			
Salbutamol	Ventoline	Solution buvable 150 ml	Ne pas dépasser 2 mois.
Sirolimus	Rapamune	Solution buvable 60 ml + seringue doseuse	- 24 h à T° < 25°C. - 30 j au réfrigérateur. - 24 h dans la seringue doseuse à T° ambiante < 25°C.
Spiramycine	Rovamycine	Sirop 150 ml nourrisson et enfant	1 mois.
Stavudine	Zerit	Solution buvable 200 ml	30 jours au réfrigérateur (+2 +8°C) après reconstitution .
Sulfaméthoxazole + Triméthoprime	Bactrim	Suspension buvable 100 ml	7 jours au réfrigérateur.
Sulpiride	Dogmatil	Solution buvable 200 ml	30 jours.

Sultopride	Barnétil	Gouttes buvables 60ml	Pas d'informations disponibles.
 retour au début			
T			
Trimébutine	Débridat	Suspension buvable 250 ml	30 jours.
Trimétazidine	Vastarel	Solution buvable 60 ml	30 jours.
Trimipramine	Surmontil	Solution buvable 4% 30ml	180 jours.
 retour au début			
V			
Valproate de Sodium	Dépakine	Gouttes 40 ml	30 jours.
Valproate de Sodium	Dépakine	Sirop 150 ml	20 jours.
Vitamine D	Dedrogyl	Solution buvable 10 ml	90 jours à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Vitamine E	Vitamine E Orphan	Suspension 100 ml	1 mois après ouverture.
Vitamines	Alvityl	Sirop 150 ml	Pas d'informations disponibles.
 retour au début			
X			
 retour au début			
Z			
Zidovudine	Rétrovir	Solution buvable 100 mg / 10 ml 200 ml	Pas d'informations disponibles.
Zipéprol	Respilène	Sirop pédiatrique 200 ml	1 mois à 4°C.
Zuclopenthixol	Clopixol	Gouttes 2% 20 ml	3 mois.

 **Retour au sommaire**